


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель представительства  
компании «Novartis Animal Health d.o.o.»



Кузнецов И.П.

7 апреля 2011 г.



**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению Непорекс® 2 SG для борьбы с личинками мух**

(организация-производитель компания «Schirm AG»/ «Ширм АГ», Германия)

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Непорекс® 2 SG (Neporex® 2 SG).  
Международное непатентованное наименование: циромазин.
2. Форма выпуска: водорастворимые гранулы.  
Непорекс® 2 SG в качестве действующего вещества (ДВ) содержит циромазин (2-циклопропиламино-4,6-диамино-с-триазин) – 2%, а в качестве вспомогательных компонентов – полиэтиленгликоль – 0,03%, воду и мочевины – до 100%.
3. Выпускают Непорекс® 2 SG в полиэтиленовых пакетах и контейнерах.  
Срок годности при соблюдении условий хранения - 5 лет со дня изготовления.  
Непорекс® 2 SG запрещается применять по истечении срока годности.
4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2°C до 30°C.
5. Непорекс® 2 SG следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный препарат или его рабочий раствор уничтожают отдельно от бытовых отходов в специально отведенных местах, вдали от источников питьевой воды и водоемов.

**II. Фармакологические свойства**

7. Непорекс® 2 SG – инсектицидный препарат.  
Циромазин, входящий в состав инсектицидного препарата, является регулятором роста насекомых, действует на личинок насекомых путём ингибирования синтеза хитина, активен в отношении обитающих в животноводческих помещениях личинок мух, включая *Musca spp.*, *Stomoxys calcitrans*, *Drosophila spp.*, *Lucilia spp.*  
Под действием циромазина нарушается процесс развития личинки, которая погибает до превращения во взрослую особь. Непорекс® 2 SG не действует на куколку и взрослую особь.  
Непорекс® 2 SG по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

**III. Порядок применения**

8. Непорекс® 2 SG применяют для дезинсекции животноводческих помещений, других объектов ветеринарного надзора против личинок мух.
9. Препаратом обрабатывают места размножения насекомых. Не подлежат обработке места скопления насекомых (потолки, стены и т.д.), так как Непорекс® 2 SG не действует на взрослых особей.

10. Непорекс® 2 SG применяют путем сухого рассеивания, опрыскивания или смачивания мест размножения насекомых раствором препарата из расчета 0,5 г ДВ на 1 м<sup>2</sup> поверхности.

Метод сухого рассеивания применяют для обработки влажного или жидкого навоза путем непосредственного равномерного нанесения.

Метод опрыскивания включает в себя приготовление раствора препарата и опрыскивание поверхностей мест размножения мух с помощью механического или автоматического оборудования для распыления.

Метод смачивания предполагает обработку мест размножения насекомых раствором препарата с помощью лейки.

Одновременной обработке подлежат все места размножения насекомых.

Нормы расхода препарата на 10м<sup>2</sup> поверхности представлены в таблице 1.

Таблица 1

Тип помещения	Количество Непорекса® 2 SG для обработки 10 м <sup>2</sup> поверхности		
<b>Коровники</b>			
<p><b>Глубокая подстилка:</b> Обработать полосу шириной около 50 см вдоль стен, вокруг и под стойлами, где подстилка не утаптывается животными, обработать края и области разлива вокруг кормушек и поилок, места скопления навоза.</p> <p><b>Домики для телят на улице:</b> Обработать все поверхности путем распыления или смачивания примерно через 3 дня после удаления навоза. Повторять обработку после каждого удаления навоза или обнаружения личинок мух.</p>	Смачивание 250 г на 7,5 литров воды	Опрыскивание 250 г на 2,5 литра воды	
<p><b>Коровники с решетчатым полом:</b> Обработать всю поверхность пола сразу после очистки навозной ямы. Повторять обработку после каждого удаления навоза или обнаружения личинок мух.</p>	Сухое рассеивание: 250 г		
<b>Свинарники</b>			
<p><b>Решетчатый пол:</b> Обработать всю поверхность пола сразу после очистки навозной ямы. Повторять обработку после каждого удаления навоза или обнаружения личинок мух.</p> <p><b>Система все пусто - все занято:</b> Обработать путем сухого распыления немедленно после уборки помещения, до постановки животных.</p> <p><b>Глубокая подстилка:</b> Обработать путем опрыскивания или смачивания через 3 дня после удаления навоза. Повторять обработку после каждого удаления навоза или обнаружения личинок мух. Обработать всю поверхность навоза и области разлива вокруг кормушек и поилок.</p>	Сухое рассеивание  250 г	Смачива- ние  250 г на 7,5 литров воды	Опрыс- кивание  250 г на 2,5 литра воды



<b>Птичники</b>			
Обработать всю поверхность через 1 неделю после удаления помета. Повторять обработку после каждого удаления помета или обнаружения личинок мух.	Влажная подстилка	Сухая подстилка	
	Сухое рассеивание  250 г	Смачивание  250 г на 7,5 литров воды	Опрыскивание  250 г на 2,5 литра воды

11. Повторные обработки проводят через 2 недели.

12. Запрещается обрабатывать инсектицидным раствором кормушки, поилки и поверхности, с которыми будут контактировать продукты питания, корма и животные.

13. Не рекомендуется использовать препарат в смеси с другими пестицидами.

#### IV. Меры личной профилактики

14. Все виды работ с Непорексом® 2 SG проводят, соблюдая общие правила гигиены и техники безопасности, с использованием средств индивидуальной защиты (хлопчатобумажный костюм или халат, резиновые перчатки, головной убор, респиратор и защитные очки).

15. К работе не допускаются беременные и кормящие грудью женщины, лица моложе 18-летнего возраста и имеющие противопоказания для работы с инсектицидными средствами.

16. При приготовлении и применении рабочего раствора Непорекса® 2 SG следует избегать пыления и попадания гранул или раствора на кожу, в глаза, органы дыхания и внутрь.

В случае загрязнения не рабочих поверхностей продуктом или рабочим раствором, их следует тщательно очистить, соблюдая правила защиты окружающей среды, собрав раствор или гранулы в соответствующую емкость для дальнейшей утилизации.

17. Во время работы запрещается принимать пищу, пить и курить. По окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

18. При несоблюдении мер предосторожности и попадании Непорекса® 2 SG или его рабочего раствора на кожу, загрязненные места следует вымыть большим количеством проточной воды с мылом, при попадании в глаза их следует тотчас в течение нескольких минут промыть большим количеством проточной воды, при попадании в дыхательные пути пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух, обеспечив тепло и состояние покоя и немедленно обратиться за медицинской помощью; при попадании внутрь следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

19. Пустые емкости из-под инсектицидного средства запрещается использовать для бытовых целей или сжигать. Они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: «Schirm AG», Division Sifokan: Dieselstrasse 8, D-85107 Baar-Ebenhausen, Germany (Германия).

Инструкция разработана компанией «Novartis Animal Health d.o.o.», Verovskova 57, Ljubljana, 1000, Slovenia (Словения).

 NOVARTIS

Novartis Animal Health d.o.o.